
ETAPA 10
Sierra del Jobo
Alfarnate
MA-4103
A-4152
MA-4101
Área de Descanso
MA-4102
Alfarnatejo
Sierra de Enmedio
Sierra de Rey
Nacimiento del Río Borbollón
Doña Ana
La Molina
Pulgarín Alto
Pulgarín Bajo
Río Sabar
Huertecillas
A-7204
A-356
Arroyo de la Cueva
Arroyo de las Zorreras
Arroyo de la Golilla
Riogordo
Río de la Cueva
Arroyo de Juan Pérez
N
O
E
S
km
0
1

ETAPA 10
Alfarnatejo - Alfarnate

LOCALIZACIÓN

Se da inicio a la etapa en Pulgarín Alto (término municipal de Alfarnatejo), desde donde se asciende un primer tramo por la carretera, para descender a continuación y buscar los tajos de Gómer y Doña Ana. Esta etapa conecta el corredor de Colmenar-Periana con la depresión de Alfarnate. Después de recorrer **18,1 km** se llega a Alfarnate tras dejar atrás Alfarnatejo.


DESCRIPCIÓN

SOBRE LA AVIFAUNA:

Si la etapa está marcada por los tajos por los que se pasa, la avifauna presente también lo está por lo frecuente que resulta en su recorrido este tipo de medio. Cultivos de olivar, recientes y centenarios, junto a extensiones de cereal y formaciones de encinas y pinos, suponen un medio con capacidad de acogida para una elevada diversidad de especies.

ESPECIES SINGULARES

El inicio está marcado por el cultivo de olivar, hasta que se llega a la carretera por la hay que hacer un tramo para acceder de nuevo a una pista terriza. En este tipo de medio, con olivos de gran envergadura y con troncos lo suficientemente gruesos como para permitir la



Alzacola. FOTO: TT

¿SABÍAS QUÉ...

El alzacola es una de las especies de aves menos conocidas de la península Ibérica, aunque las personas vinculadas a esta etapa saben bien de qué pájaro estamos hablando. Su costumbre de levantar la cola hasta casi llevarla al dorso la convierte en fácilmente reconocible. Si recorremos la etapa en el periodo comprendido entre mayo y agosto tendremos ocasión de observar a esta especie, aunque su detección es bastante más fácil si aprendemos a reconocer su canto. A diferencia de otras especies, el alzacola no es muy madrugador y es más frecuente escucharlo a media mañana que a las claras del día. Es una especie muy valorada por los turistas ornitológicos procedentes del centro y norte de Europa. TEXTO: ARM



Escribano montesino. FOTO: JLM



Observando aves desde la senda. FOTO: ARM

nidificación de muchas especies, pueden observarse perdiz roja, abubilla, petirrojo, alzacola, mirlo común, zorzal común, curruca cabecinegra, curruca capirotada, mosquitero común, carbonero común, alcaudón común, estorninos negro y pinto, pinzón vulgar, jilguero, verdecillo y verderón común, entre otras especies.

Una vez se comienza a progresar sobre retamares y tierras de cultivo, las especies más frecuentes pasan a ser la golondrina común, avión común, cogujada común, bisbita común, lavandera blanca, tarabilla común, collalba rubia, buitrón, gorrión común y triguero. En el cortijo de Auta se cruza un arroyo donde

Vista de los tajos de Gómer y Doña Ana. FOTO: ARM





Los tajos al fondo. FOTO: ARM

se concentran las aves en busca de agua y donde podremos ver ruiseñor bastardo y lavandera cascadeña. A partir de este punto se progresa de nuevo sobre zonas de cultivo, que dan paso a un encinar que será el que nos conduzca a la nava de Alfarnatejo. En este tramo se pasa cerca de los cortados y las especies que podrían observarse son, principalmente buitre leonado, águila perdicera, cernícalo vulgar, halcón peregrino, búho real, paloma bravía, avión roquero, colirrojo tizón, collalba negra, roquero solitario, roquero rojo en las cumbres de los tajos, gorrión chillón, cuervo y chova piquirroja.



Acentor común. FOTO: JLM





Tajo Bermejo. FOTO: ARM

Ya en la zona de encinar, que nos acompañará prácticamente hasta el final de la etapa, aparecerán paloma torcaz, tórtola común, zorzales charlo y alirrojo, zarcero común, mosquitero papialbo, reyezuelo listado, papamoscas gris, herrerillo común, alcaudón meridional, pardillo, lúgano y escribano soteño. Otras especies que están presentes en la etapa son el águila culebrera, gavilán, totovía, curruca mirlona, agateador común y escribano montesino, que es especialmente abundante en el entorno de la antigua cantera, hoy día transformada en escombrera, antes de llegar a la estación depuradora de aguas de Alfarnate. Otras especies, de presencia ocasional e irregular durante el invierno son el pinzón real, camachuelo común y escribano cerillo.



Alcaudón común. FOTO: JLM

FENOLOGÍA

Se recomiendan la primavera, y primeras semanas de verano, y el invierno para realizar la etapa, momentos en los que la diversidad de especies

Tramo de la senda. FOTO: ARM



es más alta. En primavera es posible observar alzacola y otras especies migradoras de larga distancia, mientras que en invierno la comunidad de aves se enriquece de manera notable con especies procedentes del norte de Europa.

VALORES NATURALES

Hasta hace poco tiempo la nutria no estaba presente en esta zona de la provincia, aunque desde principios de la presente década ha pasado a ocupar de manera estable algunos cauces fluviales del sector oriental de Málaga. Los ríos Vélez y de La Cueva acogen a nutrias en sus tramos bajo y medio y en el arroyo que pasa por el cortijo de Auta podremos encontrar huellas y otros rastros de la especie si buscamos con atención.



Mirlo capiblanco. FOTO: JLM



Antes de iniciar la subida por el encinar. FOTO: ARM