

Archidona

Hoz de Marín

Villanueva del Trabuco

Villanueva del Rosario

ETAPA

12

0 1 km



ETAPA 12

Villanueva del Rosario - Archidona

LOCALIZACIÓN

La etapa se inicia en Villanueva del Rosario, en el puente sobre el Arroyo de la Canaleja, y tras **18,5 km** en los que se cruza el río Guadalhorce, encinares adeshados y la espléndida Hoz del arroyo de Marín, se llega a Archidona.

DESCRIPCIÓN

SOBRE LA AVIFAUNA:

Lo más destacable de la etapa son las dehesas que se recorren, unido al recorrido que se realiza junto al río en la Hoz de Marín. Además, se camina por zonas de cultivo, pinares y matorrales que aportan elementos de interés a la etapa.




Vista de un tramo de la etapa que discurre por el interior de la Hoz de Marín. FOTO: ARM

ESPECIES SINGULARES

La etapa comienza siguiendo el cauce del arroyo cerezo, que más adelante se une al río Guadalhorce. Aquí predomina una constreñida vegetación de ribera, empujada al cauce por los cultivos, donde aparecerán entre otras especies lavanderas blanca y cascadeña, petirrojo, ruiseñor común, tarabilla, mirlo común, currucas capirotada y cabecinegra, carbonero común, estorninos negro y pinto,

¿SABÍAS QUÉ...



La Hoz de Marín es una garganta excavada por el arroyo Marín que ha conformado un enclave de singular belleza paisajística. Como particularidad geológica destaca la presencia de un karst de yesos y también de rocas volcánicas. Además alberga uno de los escasos bosques autóctonos de pino carrasco, en los que resulta frecuente la presencia de ciervos procedentes de áreas naturales cercanas. TEXTO Y FOTO: JSM



Buitre leonado. FOTO: DPM

oropéndola, gorrión común, pinzón vulgar, jilguero, verdecillo, verderón, pardillo y escribano soteño. En los vecinos campos de labor serán la perdiz roja, mochuelo, cogujada común, tarabilla común, buitron y triguero las especies más frecuentes.

En la zona de cortijos veremos golondrinas común y dáurica y gorrión común, junto a tórtolas turcas. A lo largo del tramo en el que se cruza repetidamente la autovía, y una vez se deja esta atrás,



Papamoscas cerrojillo. FOTO: JLM



Pito real. FOTO: JLM

se llega a una zona adeshada de gran valor ornitológico. Predominan aquí la paloma torcaz, tórtola común, cuco, autillo, cábaro, chotacabras pardo, vencejos pálido y común en vuelos generalmente de caza, abubilla, abejaruco, pito real, totovía, cogujada montesina, bisbita común, petirrojo, collalba rubia, mirlo común, zorzales común, charlo y alirrojo, zarcero común, curruca capirotada, reyezuelo listado, papamoscas gris, herrerillo común, carbonero común, agateador común, trepador azul, alcaudones común y meridional, grajilla, estorninos negro y pinto, gorrión moruno, pinzón vulgar, verdecillo, verderón común, jilguero, pardillo, lúgano y picogordo. Algunos inviernos el pinzón real puede observarse



Torcecuello. FOTO: JLM

integrado en bandos de otros fringílicos. En las zonas de cultivo que se cruzan entre las dehesas podremos ver también cernícalo vulgar y al todavía escaso en Málaga elanio azul; en el mes de mayo de 2014 se pudo observar en esta zona un ejemplar adulto junto a dos pollos.



Mito. FOTO: JLM



Zorzal charlo. FOTO: JLM

La entrada a la Hoz de Marín se hace a través de un almendral y la siguiente mancha arbórea que cruzamos es un pinar, en el que podremos ver carbonero garrapinos y comenzaremos a oír los primeros piquituertos de la jornada, además de otras especies forestales mencionadas anteriormente. Es este un paraje de gran belleza con una vegetación de ribera bien conservada donde veremos con relativa facilidad rabilargo y donde es más probable que oigamos, dado sus hábitos discretos, al torcecuello, pito real y oropéndola. También podremos ver mitos, y si estamos atentos a las siluetas que vuelan



Rabilargo. FOTO: JLM

alto, podremos distinguir con un poco de suerte la del águila perdicera; en este paraje se encuentra uno de los pocos nidos conocidos a nivel provincial sobre árbol. También es posible ver durante

la etapa ratonero común, gavilán, azor, águila culebrera y águila calzada.

La llegada a Archidona es una zona muy buena para observar vencejos, entre los que podremos distinguir los reales,



Picogordo. FOTO: JLM



Pareja de águilas perdiceras. FOTO: JLM



Ciervo. FOTO: ARM

con su llamativo vientre blanco. En los retamares que nos conducen al final de la etapa serán cogujadas, curruca cabecinegras y trigueros las especies más frecuentes.

VALORES NATURALES

La etapa cruza zonas donde pueden observarse con relativa facilidad ciervos,

principalmente en la zona del cortafuego por el que se accede al río Marín. Además, otras especies de mamíferos que podremos detectar a través de las huellas y rastros son zorro, tejón, turón, garduñas, gineta, meloncillo y gato montés. En la Hoz de Marín encontraremos junto al cauce, si las buscamos, rastros de nutria. ◉



Tarabilla norteña. FOTO: JLM