






ETAPA 6

Frigiliana - Cómputa


LOCALIZACIÓN

La etapa que nos ascenderá a miradores privilegiados de la sierra Almijsara se inicia en la plaza del Ingenio de Frigiliana, desde donde se dirige hacia la aldea de El Acebuchal. Con una longitud de **26,4 km** y tras ascender a cotas por encima de los 1000 msnm, se acaba en la plaza del Carmen de Cómputa.

DESCRIPCIÓN

SOBRE LA AVIFAUNA:

El inicio se produce en un entorno urbanizado, que poco a poco cede paso a una formación de pinar, que nos acompañará a lo largo de un buen tramo de la etapa, con diferentes niveles de cobertura. Arroyos y zonas de matorral nos conducen a las zonas más altas y marcan la avifauna de la etapa, junto a las paredes verticales que acogen una rica fauna rupícola.



Curruca rabilargas. FOTO: JLM

ESPECIES SINGULARES

Se sale desde el núcleo urbano de Frigiliana y se hace un primer tramo siguiendo la carretera, donde predominan casas y zonas arboladas con pinos. Así, lavandera blanca, colirrojo tizón, gorrones y estorninos, propios de zonas humanizadas, comparten territorio con especies más propias de ambientes forestales como el mirlo común, mosquitero común, carbonero

¿SABÍAS QUÉ...

Si tuviésemos que hablar de un grupo de aves características del Mediterráneo, las **curruca**s merecerían un papel destacado. Se trata de aves de pequeño tamaño que pertenecen al género *Sylvia*, el cual está compuesto por 26 especies diferentes, que aglutinan a 34 subespecies. De todas ellas podremos observar a lo largo del año hasta 8 especies diferentes en el recorrido de esta etapa, destacando su interés para las especies de matorral, y concretamente para las curruca cabecinegra, rabilarga y tomillera. Su variedad de plumajes atendiendo al sexo y a la edad, unido a su abundancia, convierten a las curruca en un grupo interesante para la observación de aves. Sus cantos suponen un desafío para los oídos que se inician, y también para los expertos. TEXTO: ARM



común y pinzón vulgar. A lo largo de este primer tramo asfaltado podremos observar también tórtola turca, vencejos común y pálido, golondrinas y aviones comunes, petirrojo, colirrojo tizón, curruca cabecinegra, carbonero garrapinos, jilguero y verdecillo.

Una vez se toma la pista que nos conduce al Acebuchal comienza un ambiente propiamente forestal, con pino carrasco, donde podremos observar especies como el zorzal charlo, agateador común, papamoscas gris y verderón común, a los que se suma chochín, petirrojo, ruiseñor común, curruca capirotada, ruiseñor bastardo, oropéndola, piquituerto y escribano soteño conforme nos acercamos al arroyo.

Desde el acebuchal se asciende por una rambla con adelfas y pinos de gran porte, donde las especies predominantes son la paloma torcaz, tórtola común, zorzal común, curruca cabecinegra, herrerillo capuchino y lúgano, aunque también podremos ver a las otras especies forestales ya mencionadas. Esta es básicamente la composición de

la avifauna de la etapa hasta que se alcanzan cotas más altas y se llega a zonas abiertas, donde además es posible observar perdiz roja, abejaruco, abubilla, vencejos, tarabilla común, collalba rubia, zarcero común, alcaudón común, pardillo común y escribano montesino.

Pasado el cortijo del Daire se cruzan extensiones importantes de aulagares y matorral, donde nidifican terrera común y curruca rabilarga, siendo el momento de estar atento al cielo para observar algunas de las rapaces presentes en la etapa. Esta sierra acoge azor, gavilán, ratonero común, águilas culebrera y calzada, y también en las gargantas que forman los arroyos y en los cortados, águilas perdicera y real. También podremos ver cernícalo vulgar y halcón peregrino, generalmente en zonas cercanas a cortados, donde podremos ver también collalba negra, roquero solitario y cuervo. La observación de estas especies en un entorno tan montañoso resulta especialmente gratificante para el aficionado a las aves.

Cabría destacar la presencia de otras especies, aunque sean de difícil



Vista de un tramo de la etapa, que conduce al cortijo del Daire

FOTO: ARM



observación, como el cuco, autillo, cárabo, búho real, chotacabras pardo y pito real; se trata en todos los casos de especies que resultan fácilmente identificables a través de sus cantos o reclamos. La llegada a Cómpea nos acercará de nuevo a las especies típicamente urbanas.

FENOLOGÍA

Si se tiene en cuenta la longitud y dureza de la etapa, junto a la fenología de la mayoría de las especies que pueden observarse, se recomienda evitar los meses de calor fuerte.

VALORES NATURALES

Este recorrido ofrece una vegetación muy variada y adaptada a las características del medio (arenas calcáreas que proceden de la descomposición de los mármoles). La formación vegetal predominante es un pinar de repoblación acompañado de distintos arbustos entre los que destacan la coscoja, romero, enebro y jarilla calcícola, también llamada romero macho por su semejanza a esta planta aromática. En las zonas más bajas el pino carrasco es el más abundante y conforme se gana altura va siendo sustituido por el pino resinero, con



Lagartija colirroja (*Acanthodactylus erythrurus*). FOTO: ARM



acículas (hojas) de mayores dimensiones y de un verde claramente más oscuro. En las zonas donde no se desarrolla el pinar lo sustituye un matorral, dominado por las aulagas y romero. En los arroyos y barrancos aparecen adelfas, sauces, zarzamoras, juncos y, en las zonas de umbría, brezos, identificables por sus ramilletes de flores rosadas. En la parte inicial del recorrido aparece el boj de hoja ancha, fácil de identificar por el color rojizo que adquieren sus hojas en primavera y verano. Otra especie de interés, que junto al mencionado boj encuentran en el límite provincial



Estornino negro. FOTO: JLM



Zorzal charlo. FOTO: JLM

entre Málaga y Granada su área de distribución peninsular, es el *Cneorum triccocum*. Ambas aparecen catalogadas en peligro de extinción en el Libro Rojo de la Flora amenazada de Andalucía. Otra especie de interés, y que a lo largo de la Gran Senda de Málaga sólo puede observarse en esta etapa, es el espino



Una de las caleras que se cruzan en la etapa. FOTO: ARM



Arroyo con adelfas en las cercanías de El Acebuchal. FOTO: ARM



cambrón (*Maytenus senegalensis*), de distribución ibero-africana que en España sólo lo aparece en el litoral oriental de Andalucía y costa de Murcia. ●



Dianthus malacitanus. FOTO: ARM

Piquituertos (macho y juvenil). FOTO: JLM

