



ETAPA 13

Archidona - Villanueva de Tapia

LOCALIZACIÓN

Se inicia la etapa en Archidona, siendo la sierra la que marca la dirección de progresión hacia el noreste. Olivos y dehesas con encinas maduras marcan los **17,1 km** que separan el punto inicial de Villanueva de Tapia.

DESCRIPCIÓN

SOBRE LA AVIFAUNA:

Es una etapa que comienza con vistas hacia los cantiles de la sierra de Archidona y que a continuación atraviesa zonas de cultivo que acogen grandes ejemplares de encinas. Se atraviesa una zona adehesada bien conservada y a continuación se pisan por primera vez las extensiones de monocultivo de olivar.



Rabilargo. FOTO: DPM

ESPECIES SINGULARES

En el entorno de Archidona podremos observar paloma bravía, tórtola turca, vencejos pálido, común y real, lavandera blanca, golondrinas común y dáurica, aviones común y roquero, colirrojo tizón, estorninos negro y pinto y gorrión común. Una vez se deja atrás el casco urbano las vistas a la sierra centran nuestra atención, y serán especies como el

¿SABÍAS QUÉ...

Al mirar el mapa del área de distribución mundial del rabilargo resulta sorprendente comprobar como aparece desde Rusia y China hasta Japón, con una población separada por más de 9000 kilómetros en la península Ibérica. Se trata de una especie gregaria y ruidosa, muy característica por su larga cola, sus alas azuladas y la negra boina. Durante mucho tiempo se ha pensado que la población ibérica procedía de ejemplares traídos desde Asia por comerciantes, en el siglo XVI, pero recientemente se encontraron restos fósiles en Gibraltar, lo que invita a pensar que ambas poblaciones se separaron durante la última glaciación. En la actualidad los rabilargos ibéricos (*Cyanopica cooki*) se consideran una especie distinta a los rabilargos asiáticos (*Cyanopica cyanus*). TEXTO: ARM



Alcaudón común. FOTO: JLM

cernícalo vulgar, el roquero solitario, la grajilla y la chova piquirroja las que podamos ver a distancia, además de alguna rapaz de gran tamaño como las águilas culebrera, real y perdicera, o el halcón peregrino. También está presente en la zona el búho real.

Las especies ligadas a los cultivos que se cruzan en la etapa son,

mayoritariamente, cogujada común, petirrojo, mirlo común, curruca cabece Negra, mosquitero común, estorninos negro y pinto, jilguero, verderón, pardillo y verdecillo. Las encinas salpicadas aportan a este tramo la presencia de ratonero común, búho chico, carbonero común, cuervo y pinzón vulgar.

Verdecillo. FOTO: JLM





Zarcero común. FOTO: JLM

Una vez se cruza la autovía se entra en la zona adhesionada de la etapa donde podremos ver paloma torcaz, tórtola común, cuco, abubilla, zorzales charlo y común, currucas mirlona y capirotada, mosquitero común, papamoscas gris, agateador común, alcaudones común y meridional, herrerillo común, mito, los visibles y alegres grupos de rabilargo y picogordo.

A partir del momento en el que tan sólo nos queda bajar hasta llegar a Villanueva de Tapia nos adentramos en olivar, donde además de algunas de las especies ya citadas, tendremos ocasión de observar alcaraván, perdiz roja, chotacabras pardo, cogujada común y fringílicos, principalmente. Al llegar a la localidad de destino de nuevo aparecerán las especies típicamente urbanas. ○

Perdiz roja. FOTO: JLM

