

Láminas comparativas





1. ADULTOS GRANDES GAVIOTAS COMUNES DE MÁLAGA.



1. Gaviota de Audouin tamaño algo menor, pico rojo, patas grises

2. Gaviota patiamarilla, abundante todo el año, pico grueso, gonys marcado, gris del dorso entre 3-6

3. Gaviota sombría, abundante en invierno, cabeza más redondeada, pico más recto y corto, gris del dorso entre 6 y 19





2. ADULTOS GRANDES GAVIOTAS POCO FRECUENTES O RARAS EN MÁLAGA.



Gaviota argétea. Dorso gris muy claro entre 1 y 4, patas rosas, iris claro

Gaviota cáspica. Dorso gris claro entre 2 y 5, patas largas amarillo-rosáceas, iris generalmente oscuro, gonys poco patente.



Gavión atlántico. Mayor tamaño entre gaviotas, dorso muy oscuro entre 12 y 19, patas rosas.





3. GAVIOTAS MEDIANAS COMUNES EN MÁLAGA (1).
ADULTOS PLUMAJE ESTIVAL (GAVIOTAS REIDORA Y CABECINEGRA).





4. GAVIOTAS MEDIANAS COMUNES EN MÁLAGA (2).



Gaviota reidora invernante
Cabeza pequeña
Iris oscuro
Pico fino



Gaviota cabecinegra invernada
Cabeza grande y máscara patente
* Adulto puntas alas blancas
* En 2º inviernos con manchas negras en las puntas




Gaviota picofina
Pico más largo y fino
* Invernada cuerpo blanco
Pico brillante
* Estival color más rosáceo
Pico rojo oscuro
** Algunos inmaduros con aurículas aunque poco patentes





5. ADULTOS GAVIOTAS COMUNES DE MÁLAGA EN VUELO





6. JUVENILES Y 1^{er} INVIERNO DE GRANDES GAVIOTAS COMUNES EN MÁLAGA (1)



Gaviota de Audouin

Gaviota de Audouin

Fácil identificación (en todos los plumajes)
Estructura típica, poca variabilidad.
Patas grises, frente muy tumbada,
la cabeza recuerda a “embudo” o “pera”.
Carente de diseño barrado.
Proyección primaria larga
dando aspecto “colilarga”.
Muy oscuros

Las gaviotas Patiamarilla y Sombría
son muy semejantes, de difícil
identificación por su alta variabilidad.



Gaviota patiamarilla

Gaviota patiamarilla

(versus sombría)

Pico algo más grueso y grande,
con gonys más marcado.
Cabeza algo mayor, coloración
del dorso algo más clara con
varios tonos marrones, poco
uniforme. Bordes blancos de
las plumas dorsales, irregulares
y más anchos. Proyección primaria
levemente más corta (aparición
de cola más corta)



Gaviota sombría

Gaviota sombría

(versus patiamarilla)

Pico ligeramente más corto,
compl. negro, cabeza algo más
pequeña. Coloración del dorso
más monótona y uniforme
“chocolate oscuro”. Bordes de
las plumas del dorso más finos
y lisos. Terciarias uniformemente
oscuras. Proyección primaria
levemente mayor (aparencia una
“cola” un poco más larga).



7. GAVIOTAS ARGÉNTEA, PATIAMARILLA Y SOMBRÍA DE 1^{er} INVIERNO
(PATRONES DE Terciarias y DISTANCIAS EN PROYECCIONES ALARES)




Lámina: María F.



8. 1^{er} INVIERNO DE PATIAMARILLA, SOMBRÍA, ARGÉNTEA Y GAVIÓN ATLÁNTICO.



Gaviota patiamarilla

Pico algo más grueso, grande, con gonyes más marcado. Cabeza algo mayor. Coloración del dorso algo más clara. Varios tonos marrones, plumaje menos uniforme. Bordes de las plumas dorsales blancos, irregulares y anchos. Proyección primaria levemente más corta (aparición de cola más corta).

Gaviota sombría

Pico ligeramente más corto, más recto, con gonyes menos marcado. Compl. negro cabeza algo más pequeña. Coloración del dorso más monótona y uniforme "chocolate oscuro". Bordes de las plumas del dorso más finos y lisos. Terciarias uniformemente oscuras. Proyección primaria levemente mayor (aparencia de una "cola" un poco más larga).

Gaviota argétea

(ocasional en Málaga)

Aspecto muy claro, pardo-grisáceo.

Pico con la base rosa.

Coverteras alares "como tablero de ajedrez" y muy uniformes.

Márgenes en 3^{as} muy escotados.

Cola, rectrices ext. muy blancas.

Proyección primaria corta.

Gavión atlántico

Tamaño mayor que el resto de gaviotas. Cabeza muy blanca con pico masivo. Máscara contrastada con líneas típicas detrás del ojo. Diseño de coverteras alares arlequinado, muy blanco. Proyección primaria corta (aspecto colicorto).



9. INMADUROS GRANDES GAVIOTAS EN VUELO.



ocasional gavión atlántico

ventana difusa

obispillo poco barrado



ocasional gaviota argéntea

Obispillo muy barrado


persiana veneciana



ventana ausente

Gaviota sombría

franja ancha muy negra



gaviota Audouin

franja blanca




muy negro

muy vermiculada



franja poco ancha límite poco definido



muy variable (clara)

Gaviota patiamarilla



10. INMADUROS DE GAVIOTAS MEDIANAS EN INVIERNO.

(Restos plumas juveniles en alas)



Gaviota cabecinegra

1º invierno

Gaviota cabecinegra

Cabeza y cuerpo redondeados, pico grueso, máscara facial.

Gaviota cabecinegra
2º invierno



Gaviota reidora
1º invierno

Gaviota reidora

Tamaño levemente menor. Cabeza pequeña. Pico y patas naranja. Pico fino, no muy largo.

Gaviota reidora
1º invierno nadando



Gaviota picofina
1º invierno

Gaviota picofina

Tamaño algo mayor. Cabeza y cuerpo alargados. Aurícula difusa o ausente. Pico y patas naranjas. Pico fino, bastante largo.

Gaviota picofina



1º invierno nadando



9. JUVENILES DE GAVIOTAS MEDIANAS COMUNES.



Gaviota reidora



Gaviota cabecinegra



Gaviota picofina

1. Gaviota reidora.

Pico fino, color bermejo en el cuello.
Aurícula en la cara.

2. Gaviota cabecinegra.


Pico grueso, cabeza redondeada,
plumas dorso festoneadas.

3. Gaviota picofina.

Pico largo y fino, cabeza alargada,
aurícula alargada o inapreciable.



10. INMADUROS DE GAVIOTAS MEDIANAS EN VUELO





11. ALGUNOS EJEMPLOS DE TAMAÑOS RELATIVOS DE GAVIOTAS DE MÁLAGA (I).



Gavión atlántico de tamaño mayor que el resto de gaviotas



Gaviota sombría de mayor tamaño que la gaviota de Audouin



Gaviota de Audouin de mayor tamaño que las gaviotas picofina, cabecinegra y reidora.



11. ALGUNOS EJEMPLOS DE TAMAÑOS RELATIVOS DE GAVIOTAS DE MÁLAGA (II).



Gaviota cana (ocasional en Málaga). Tamaño algo mayor que las gaviotas cabecinegra y reidora.



Gaviota picofina con tamaño un poco mayor que la gaviota reidora.



Gaviota cabecinegra de tamaño muy similar, aunque un poco mayor, que la gaviota reidora.