



Hespérie de l'herbe-au-vent

Sloperia proto (Ochsenheimer, 1808)

DESCRIPTION

Envergure des ailes : entre 2 et 3 cm. **Ailes ouvertes** : sur l'aile antérieure, il a trois points blancs proches de l'apex, parfaitement alignés ; les deux ailes ont des bords (cils) en damier et la postérieure, des taches au centre de l'aile. **Ailes fermées** : il est marron clair ou crème et l'aile postérieure n'a pas de taches apparentes sur le bord, mais une tache centrale très caractéristique, avec un angle orienté vers l'intérieur.

CLÉ DE DÉTERMINATION VISUELLE

Trois points blancs parfaitement alignés



Taches claires

Bords en damier

Couleur de fond marron clair ou crème

Foto: José Antonio Ríos Bosquet

Bordure sans taches blanches



Tache blanche pointant vers l'intérieur

ESPÈCES RESSEMBLANTES

Hespérie des sanguisorbes : ouvert, la série proche de l'apex avant comporte quatre points ; fermé, il est de couleur rougeâtre ou marron châtaigne, avec de grandes taches sur le bord de l'aile postérieure et l'angle de la tache centrale est tourné vers l'extérieur. **Hespérie de la malope** : ouvert, il a quatre points sur l'apex, le plus bas étant décalé et très proche du bord ; fermé, il présente des taches le long du bord de l'aile postérieure.



Sertorio

Hespérie des sanguisorbes



Ajedrezada bigornia

Hespérie de la malope

BIOLOGIE ET HABITAT

Avec une seule génération annuelle, il émerge petit à petit sur une longue période, ce qui permet de le voir de mars à novembre. Mai, juin et juillet sont les mois où son activité est la plus intense.

Il vit dans tous types de milieux où poussent ses plantes nourricières, les lamiacées sauge de Jérusalem pourpre, lychnite, sauge de Jérusalem crinita et herbe au vent (*Phlomis purpurea*, *P. lychnitis*, *P. crinita* et *P. herba-venti*, respectivement). Elles se trouvent souvent dans les sous-bois, les vastes zones de garrigue et, de manière isolée, dans certains environnements dégradés par les activités humaines.

JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC
-----	-----	-----	-----	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	-----

DISTRIBUTION

Il est présent sur la majeure partie des étapes, sauf celles traversant uniquement des environnements urbains, en bord de plage (1 et 30) et de la 35. Il est aussi moins nombreux et plus localisé sur celles du littoral et du nord de la province.

