



Mélitée des centaurées

Melitaea phoebe (Goeze, 1779)

DESCRIPTION

Envergure des ailes : entre 3,4 et 5 cm. **Ailes ouvertes** : il est orange avec de larges motifs sombres composant une sorte de filet. Une tache orange sur l'aile antérieure est particulièrement remarquable : située proche de l'angle anal, elle est plus allongée que le reste et atteint la hauteur de la deuxième ou troisième file de taches située entre celle-ci et l'apex. **Ailes fermées** : la postérieure est blanche ou jaunâtre pâle avec des taches rondes entourées de jaune et bordées par deux séries d'arcs pointant vers l'intérieur de l'aile ; en parallèle, et légèrement plus à l'intérieur, se trouve une autre série de lignes parallèles, discontinues, certaines en forme d'arc pointant vers l'extérieur ; les deux séries face-à-face sont séparées par un tout petit espace.

CLÉ DE DÉTERMINATION VISUELLE



Foto: Francisco Ríos Bosquet

Tache orange plus longue que le reste



Taches orange arrondies

Lignes arquées

Ligne discontinue, droite et arquée dans le sens inverse des autres

Arcs et lignes très proches

ESPÈCES RESSEMBLANTES

Mélitée andalouse : fermé, il se distingue principalement par la séparation très claire des lignes arquées se faisant face, de couleur orange. Ouvert, seule la femelle peut être confondue, mais le dessin du filet n'est pas aussi bien défini chez celle-ci et elle n'a pas de tache allongée près de l'angle anal de l'aile antérieure. **Mélitée des scabieuses** et **Mélitée des linaires** : les deux sont en général plus petits et ne présentent pas de longue tache près de l'angle anal de l'aile antérieure.



Macho

Hembra

Mâle

Femelle

Mélitée andalouse



Minerva

Mélitée des scabieuses



Deione

Mélitée des linaires

BIOLOGIE ET HABITAT

Son unique génération annuelle vole principalement entre avril et juin. Il vit dans les habitats secs et chauds des environnements montagneux, en particulier sur les zones les plus dégradées des forêts ouvertes et de la garrigue éparse, souvent dans les rocaïles et les zones sableuses. Les chenilles s'alimentent de centaurees et de chardons des genres *Centaurea*, *Carduus* et *Carlina*.

JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC
-----	-----	-----	-----	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	-----

DISTRIBUTION

Il est connu uniquement sur les étapes traversant les sierras littorales et l'Arc calcaire central, toujours en petit nombre et localisé. Toutefois, il se trouve aussi sûrement sur les étapes situées entre Nerja et Archidona (étapes 5 à 12), ainsi que sur celles qui transitent entre la zone des barrages et Estepona (de la 20 à la 29) et sur la 31. Des populations sur les itinéraires du nord de la province ne sont pas à écarter.



Légende:

— Grand Sentier de Malaga

— Distribution des espèces le long du Grand Sentier de Malaga