Petit Sylvandre

Hipparchia alcyone (Denis & Schiffermüller, 1775)

DESCRIPTION

Envergure des ailes : entre 4,6 et 6 cm. **Ailes fermées :** il est marron, avec des marbrures sombres et grises ; il a sur l'aile antérieure un ocelle noir cerclé de jaune pâle, dont le centre est blanc ; un autre plus petit se trouve en dessous, mais il ne le montre habituellement pas. L'aile postérieure est traversée entièrement par une large bande blanche ; sur la partie marron qui recouvre la base de l'aile sont tracées deux lignes ondulées, la première, bordant le blanc, présente des angles peu fermés ; une autre ligne foncée avance en parallèle au bord postérieur. **Ailes ouvertes :** il est pratiquement impossible de le voir ainsi. Il est marron foncé, avec des franges jaunâtres sur les deux ailes, l'antérieure comporte deux ocelles noirs.

CLÉ DE DÉTERMINATION VISUELLE



Foto: Rafael Obregón Romero

ESPÈCES RESSEMBLANTES

Agreste : la différence principale est la bande blanche de l'aile postérieure, qui se resserre à l'approche du bord supérieur car la couleur marron pénètre l'intérieur de l'aile ; sur l'aile antérieure, il a un ocelle foncé près de l'angle anal aux bords peu définis, avec un point blanc au centre. **Silène :** la ligne parallèle au bord arrière de l'aile postérieure n'est pas ondulée, mais zigzagante, très anguleuse, tout comme celle qui borde la frange blanche du côté de l'intérieur de l'aile ; une frange blanche traverse la moitié de l'aile, entre la base et la frange blanche principale. Sur l'aile antérieure, l'ocelle noir est partiellement cerclé de blanc.

Agreste

Silène

BIOLOGIE ET HABITAT

Avec une seule génération annuelle, il vole de façon exceptionnelle de fin mai à septembre, plus habituellement et abondamment en juin et juillet. Il habite principalement les milieux forestiers bien conservés, comme les pinèdes, les forêts de chênes verts, de chênes-lièges (dans une moindre mesure) et de sapins d'Espagne, mais également dans les rocailles et les prairies de légumineuses. Entre 650 et 1900 m d'altitude. Il se trouve souvent dans les zones ouvertes des environnements boisés ; prairies, herbages et garrigue éparse. Les chenilles s'alimentent de graminées des genres *Festuca* et *Arrhenatherum*, bien qu'occasionnellement ce papillon ponde des œufs sur des lieux différents, au sol, sur des pierres ou des ajoncs (*Ulex spp.* et *Genista hirsuta*).

JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

DISTRIBUTION

Il est présent ponctuellement et en petit nombre sur les étapes de l'Arc calcaire central, de la Serranía de Ronda, de la sierra d'Almijara - où il est probable qu'il puisse se trouver sur d'autres itinéraires - et de Tejeda. Il pourrait être observé de façon très localisée sur les étapes du nord, en particulier la 12, la 13 et la 14.